

Merkblatt: Ansteckende Krankheiten

Das Merkblatt gibt Auskunft über das Vorgehen beim Auftreten der häufigsten ansteckenden Krankheiten in den SchereSteiPapier Spielgruppen. Es basiert auf den „Richtlinien über den Besuch der Schule, des Kindergartens und der KiTa bei Infektiösen Krankheiten“ der Schulgesundheitskommission des Kantons Zürich.

Allgemein

Kinder mit einer ansteckenden Krankheit können zum Schutz der übrigen Kinder erst wieder in die Spielgruppe kommen, wenn sie mindestens einen Tag (24 Stunden) fieberfrei und in einem guten Allgemeinzustand sind. Im Zweifel entscheidet der/die behandelnde Arzt/Ärztin. Wird das Kind während dem Spielgruppenmorgen krank, werden die Eltern kontaktiert und aufgefordert, das Kind abzuholen. Die Eltern müssen deshalb jederzeit telefonisch erreichbar und in der Lage sein, ihr Kind abzuholen.

Kontaktpersonen wie Geschwister, Eltern, Spielkameraden sind im Allgemeinen nicht ansteckend, so lange sie keine Krankheitszeichen wie Fieber, Husten, Unwohlsein, Ausschläge etc. aufweisen. Erkältungskrankheiten/Grippe

So lange das Kind intensiv und häufig hustet, Fieber besteht und sein Allgemeinzustand reduziert ist, soll es zu Hause bleiben.

Scharlach

Mit Antibiotika behandelte Kinder können frühestens 24 Stunden nach Therapiebeginn wieder in die Spielgruppe, sofern es der Zustand des Kindes erlaubt. Ohne Antibiotika besteht ein Ausschluss während 2 Wochen. Gesunde Kontaktpersonen oder Bakterienträger sind nicht ansteckend.

Windpocken (Varicellen) Wilde Blattern

Sehr ansteckend, solange nässende Bläschen vorhanden sind. Kinder müssen zu Hause bleiben, bis der Ausschlag verkrustet ist und keine neuen Bläschen mehr aufgetreten sind (mindestens 6 Tage).

Keuchhusten (Pertussis)

Bei Antibiotika-Therapie ist der Spielgruppenbesuch nach 6 Tagen möglich, sofern es der Allgemeinzustand erlaubt. Ohne Antibiotika Ausschluss während 3 Wochen.

Infektiöse Durchfälle (Magen-Darm-Grippe)

Kein Spielgruppenbesuch, solange Symptome vorhanden sind.

Masern

Früheste Rückkehr in die Spielgruppe 5 Tage nach Beginn des Hautausschlages. Nicht geimpfte Kinder in engem Kontakt mit dem erkrankten Kind sollen 3 Wochen zu Hause bleiben, um eine weitere Verbreitung der Infektion zu unterbinden.

Mumps

Zu Hause bleiben, bis die Schwellung abgeklungen und der Allgemeinzustand gebessert ist.

Röteln

Zu Hause bleiben bis zum Abklingen des Ausschlages und des Fiebers.

Pfeiffer'sches Drüsenfieber (Mononucleose)

Zu Hause bleiben bis zum Verschwinden der Symptome nach Massgabe des/der behandelnden Arztes/Ärztin.

Kopfläuse

Siehe separates Merkblatt

Pandemie

Im Falle einer Pandemie gelten die vom Kantonsarzt erlassenen Vorgaben.